

SAKURA®

EMULSIONE CONCENTRATA (EC)
FUNGICIDA PER FRUMENTO
Meccanismo d'azione: FRAC 3

SAKURA Registrazione del Ministero della Salute n. 15199 del 20/03/2013

Composizione

Bromuconazolo puro 15,86 % (= 167g/l)

Tebuconazolo puro 10,17 % (= 107g/l)

Coformulanti* q.b. a 100

*Contiene Nafta solvente

Partita n.:*

Contenuto netto: 1-5-10-20 litri

Titolare della registrazione:

NUFARM Italia s.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano

Officina di produzione: **Nufarm S.A.S., Gaillon (Francia)**

Distribuito da:

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera 21, 20153 Milano – Tel. 02 45280.1

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.


PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia, i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso; se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleeni.

ISTRUZIONI PER L'USO

FRUMENTO (Duro e Tenero): intervenire alla dose di 1,2 litri per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium spp.*), Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoria (*Septoria spp.*) posizionando l'applicazione da inizio levata alla fioritura. Contro la fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) il trattamento andrà effettuato dalla fine della spigatura alla fioritura.

Usare il prodotto una sola volta per anno sospendendo il trattamento all'inizio della fioritura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Sakura® è un marchio registrato di Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S