

AGITARE PRIMA DELL'USO



BIGFRUIT®

Miscela liquida di aminoacidi ottenuta mediante idrolisi da proteine di soia ed estratti di alga, arricchito con zinco (Zn) per applicazioni fogliari. Liquido concentrato dell' alga *Ecklonia maxima* indicato per l'aumento della pezzatura dei frutti.

COMPOSIZIONE:

Aminoacidi liberi:	5 % p/p
Azoto (N) totale:	2,9 % p/p
Azoto (N) organico:	2,8 % p/p
Acido alginico:	0,3 p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua:	0,5 % p/p
pH:	9
Conduttività elettrica:	2490 ms/m

AMMINOGRAMMA: Triptofano, leucina, acido aspartico, glicina, alanina, licina, valina, acido glutammico, fenilalanina, istidina, arginina, serina, treonina, prolina e tirosina.

Contenuto in metalli pesanti: Classe A, inferiore ai limiti autorizzati per tale classificazione.

CARATTERISTICHE:

BIGFRUIT® è un estratto fluido di *Ecklonia maxima* ottenuto mediante estrazione acquosa a bassa temperatura in maniera tale da lasciare intatto il contenuto di nutrienti dell'alga, senza comunque modificarne nessuna delle sue caratteristiche fisico-chimiche.

Ecklonia maxima contiene naturalmente auxine e citochinine responsabili dell'allungamento cellulare e quindi dell'ingrossamento dei frutti in generale. La maggior pezzatura è inoltre dovuta al contenuto in zinco (Zn), elemento indispensabile per la biosintesi delle auxine da parte della pianta.

Inoltre, **BIGFRUIT®**, contiene aminoacidi e vitamine che intervengono nella regolazione di processi fisiologici fondamentali, il che contribuisce ad evitare stress abiotici oltre che ad apportare un effetto stimolante alle colture trattate.

PRECAUZIONI:

ATTENZIONE: H315. Provoca irritazione cutanea. **H317.** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319.** Provoca grave irritazione oculare. **P102.** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270.** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P261.** Evitare di respirare la nebbia, i vapori, la polvere. **P280.** Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito. **P305+P351+P338.** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+P313.** In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. **Componenti pericolosi : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one.** UFI JQJ5-18T8-CPKF-QGJN



CONTENUTO NETTO: 1L (1,09 kg)

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.

Partita in data di fabbricazione: Vedi su questa confezione

DOSAGGIO E MODO APPLICATIVO:

BIGFRUIT® deve essere sciolto ed applicato per via fogliare sulle diverse colture:

COLTURA	MODO APPLICATIVO	Dosi
Drupacee	Applicare a partire dalla scamicatura, ripetere il trattamento se fosse necessario dopo 7-10 giorni, durante il periodo di massima divisione cellulare dei fruttificini.	2-4 l/ha
Pomacee	Applicare a partire dalla fioritura durante il periodo dell'allegagione e della divisione cellulare.	2-4 l/ha
Kiwi	Applicare ad avvenuta allegagione dei fruttificini. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e nel caso fosse necessario effettuare anche un terzo trattamento (7-10 giorni dal secondo intervento).	2-4 l/ha
Agrumi	Aumenta la pezzatura dei frutti, migliora l'omogeneità e la distribuzione dei calibri commerciali. Trattare dopo la cascola naturale dei fruttificini. Ripetere il trattamento durante l'estate. Si raccomanda in miscela con WELGRO® POTASSIO.	200-300 cc/ha
Olivo	Applicare durante l'allegagione e l'inizio della maturazione delle drupe. Ripetere l'applicazione se fosse necessario.	2-4 l/ha
Ortaggi tutti	Applicare durante l'ingrossamento dei frutti, iniziando subito dopo l'allegagione. Ripetere il trattamento se fosse necessario.	2-3 cc/l
Vite (dal vino e da tavola)	Applicare quando gli acini hanno la dimensione di un grano di pisello e ripetere il trattamento nel caso fosse necessario.	2-4 l/ha
Fragole e piccoli frutti in generale	Applicare nei momenti di stress della pianta per superare gli arresti di crescita ed, in particolare, dalla fioritura al post allegazione per uniformare e aumentare la pezzatura dei frutti.	2-4 l/ha
Tutte le colture	Applicare durante l'ingrossamento dei frutti.	2-4 l/ha

CONDIZIONI D'IMMAGAZZINAMENTO:

Conservare il prodotto nella sua confezione originale e ben chiusa, in un luogo asciutto a 5-35 °C

AVVERTENZE ALL'UTILIZZATORE.

Le raccomandazioni e le informazioni sono frutto di ampi e rigorosi studi e prove. Senza dubbio nell'utilizzazione possono influire numerosi fattori che sfuggono dal nostro controllo (preparazione di miscele, applicazione, fattori climatici etc.). La compagnia garantisce la formulazione, composizione e contenuto del prodotto. L'utilizzatore sarà responsabile dei danni causati (mancanza d'efficacia, tossicità in generale, residui, etc.) per inosservanza totale o parziale delle istruzioni di questa etichetta.

Questo fertilizzante è legalmente autorizzato in Spagna, secondo "Real Decreto 506/2013 de 28 de junio Grupo 4 Otros abonos y productos especiales - Mezcla líquida de aminoácidos y extracto de algas" e viene immesso nel mercato italiano in base al principio di mutuo riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 515/2019.



Fabbricante: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
Viladomat 321, 5^a - 08029 Barcelona (SPAGNA) Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoaagro.com

Distribuito in Italia da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. SUCCURSALE ITALIA**
Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. +39 02 0996 6107 - E-mail: info.italia@cqmasso.com