

PRIDE® ULTRA

Acaricida su piante ornamentali, cetriolo, melone, anguria in serra

Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: gruppo 21 (IRAC)

Composizione:

FENAZAQUIN puro: g. 18,32 (200 g/L)
Coformulanti q.b. a: g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332. Nocivo se ingerito o inalato.

H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261. Evitare di respirare gli aerosol.

P264. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P301+P312. IN CASO DI INGESTIONE:

contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico

in caso di malessere. P304+P340. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Registrazione n. 8888 del 19.06.96 del Ministero della Salute

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Officine di Produzione:

SBM Formulation - 34535 Beziers - France

Sipcam Oxon S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Officine di rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 - 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 - 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 mL - 1 L

Partita n. vedere sigla sovraimpresa

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Non utilizzare in presenza di api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la serra è parzialmente aperta. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un centro antiveneni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PRIDE ULTRA è un acaricida dotato di rapida azione di contatto con efficace azione larvicida e adulticida nei confronti dei principali acari fitofagi e di alcune specie di Aleurodidi.

Si raccomanda di iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili.

In funzione del grado di infestazione applicare Pride Ultra esclusivamente in serra su:

Crisantemo, garofano, gerbera, piante ornamentali, vivai di arboree ornamentali per il controllo del ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*) e del ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Dose di applicazione: 100-125 mL (1-1.25 L/ha).

Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 100 litri di acqua per attrezzature a volume normale e con applicazioni fino ad inizio gocciolamento.

Melone, anguria, cetriolo per il controllo del ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*) e del ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Dose di applicazione: 75 mL (0.75 L/ha).

Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 500-1000 litri di acqua.

Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

Alle dosi sopraindicate, Pride Ultra possiede un'azione collaterale dei confronti degli aleurodidi delle serre (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Su colture floreali, ornamentali e vivai, iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili, eseguendo saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera superficie.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Pride Ultra con altri acaricidi aventi differente meccanismo d'azione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per cetriolo, 7 giorni prima della raccolta per melone, anguria.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC +1.703.527.3887