



ENVIROMITE FL

ENVIROMITE FL è un acaricida in sospensione concentrata utilizzabile sia in serra che in campo aperto. Applicato su fogliame, è caratterizzato da un'azione pronta per contatto e da una prolungata efficacia residua. Enviromite FL controlla tutte le forme mobili degli acari su colture orticole e frutticole ed additionally possiede una buona attività ovida nei confronti del raghetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

COMPOSIZIONE Bifenazate puro g 43,55 (480 g/L)**FORMULAZIONE** Sospensione concentrata**INTERVALLO DI SICUREZZA** 3 gg per fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchini, melone, cocomero e zucca; 14 gg per agrumi, melo, pero e vite.**N° DI REGISTRAZIONE** 16402 del 13.07.2015**CONFEZIONE** L 0,25**INDICAZIONI DI PERICOLO** **ATTENZIONE**
H317 - H373
H410 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
 Vite	Acariosi della vite (<i>Calepitrimerus vitis</i>), Raghetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragno rosso europeo (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,5 - 0,7 L/ha	Contro l'acariosi della vite trattare al germogliamento o immediatamente dopo. In caso di attacco tardivo è possibile trattare dall'allegagione alla pre-chiusura grappolo. Contro raghetto rosso bimaculato e ragno rosso europeo trattare alla comparsa dei primi acari, che avviene di solito in estate con temperature elevate e chioma ben sviluppata. Effettuare un'applicazione per anno
 Fragola (in pieno campo ed in serra)	Raghetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Raghetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20 - 25	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.
 Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchini, Melone, Cocomero e Zucca (in pieno campo ed in serra)	Raghetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Raghetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20 - 25	Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.
 Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Limetta, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo)	Raghetto rosso degli agrumi (<i>Panonychus citri</i>), Raghetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Raghetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 - 60	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare 1 applicazione per anno.
 Melo, Pero	Raghetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 - 67	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare 1 applicazione per anno.
 Soia	Raghetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Raghetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	200 - 250 mL/ha	Effettuare 1 applicazione per anno.

- Attività specifica contro i ragnetti rossi
- Acaricida selettivo
- Azione pronta, per contatto e prolungata efficacia residua

